

ในระยะแรกมักจะไม่มีปรากฏอาการ ต่อมาเมื่อเป็นมากขึ้น (อาจนานเป็นเดือน เป็นปี) จะมีอาการทั่วไป

(พบร่วมกันในมะเร็งทุกชนิด)คือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว อาจมีไข้ เรื้อรัง

ท้องอืดพ้อ คลื่นไส้อาเจียน ชีต เป็นลม ใจหวิว คล้ายหิวข้าวบ่อย ส่วนอาการเฉพาะของแต่ละโรค

(ซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนจะมีอาการทั่วไป) เกิดจากก้อนมะเร็งไปกดเบียด

หรือทำลายอวัยวะที่เป็น พอละสรุปได้ดังนี้

มะเร็งผิวหนัง ส่วนมากจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของไฟ ปาน หรือ จุดตกกระในคนแก่ โดยมีอาการคัน

แตกเป็นแผล เรื้อรังไม่ยอมหาย โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ต่อมาแผลโตขึ้นเร็ว และมีเลือดออก มีสาเหตุสัมพันธ์

กับการถูกแสงแดด(แสงอัลตราไวโอเลต) การกินยาที่เข้า สารหนู หรือน้ำมันดินที่มีผสมอยู่ในยาจีนยาไทย

การสัมผัสถูกสารหนู หรือน้ำมันดิน การระคายเคืองเรื้อรังต่อไฟ ปานหรือหูดที่มีอยู่ก่อน

มะเร็งในช่องปาก จะมีก้อนหรือแผลเรื้อรังเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก เยื่อช่องปาก ลิ้น โดยเริ่มจากฝ้าขาวๆ

ที่เรียกว่าลิวโคพลาเคีย (Leukoplakia) มีสาเหตุสัมพันธ์กับการระคายเคืองเรื้อรัง เช่น กินหมาก จุกยาสูบ

ฟันเกหรือใส่ฟันปลอมไม่กระชับ ดื่มเหล้าเข้มข้น (ไม่ผสมเจือจาง) สูบบุหรี่

มะเร็งที่จมูกและโพรงหลังจมูก มีอาการเลือดออกทางจมูก หน้าชา คัดจมูก ปวดศีรษะ ต่อมาอาจ

มีเลือดปนน้ำเหลืองออกทางจมูก หูอื้อ กลืนไม่ได้ ตาเข ต่อม่าน้ำเหลืองที่คอโต มะเร็งที่โพรงหลังจมูก

มีสาเหตุสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าเข้มข้นสูบบุหรี่ การติดเชื้อไวรัสอีบีวี (EBV)

มะเร็งที่กล่องเสียง มีอาการเสียงแหบเรื้อรังและอาจมีอาการเจ็บคอ เวลากลืนเหมือนมีก้างติดคอต่อมา

มีเลือดออกปนกับเสมหะ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการดื่มเหล้าเข้มข้น การสูบบุหรี่จัด การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

มะเร็งปอด มีอาการไอเรื้อรัง น้ำหนักลด

ไอออกเป็นเลือดปนเสมหะ มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

การสูดควันดำจากท่อไอเสียรถ เขม่าจากโรงงาน สารใยหิน (asbestos) หรือฝุ่นนิกเกิล

มะเร็งหลอดอาหาร เริ่มแรกอาจรู้สึกเจ็บเวลากินอาหาร
ต่อมากินข้าวสวยไม่ได้ ต่อมากินข้าวต้มไม่ได้

จนในที่สุดกินได้แต่ของน้ำๆ หรือ

กลืนอะไรก็ไม่ลงเลย พบมากในผู้ชาย
มีสาเหตุสัมพันธ์กับการกินอาหาร

และดื่มของร้อนๆ (เช่น น้ำชาร้อน ๆ),
การดื่มเหล้าเข้มข้น, การสูบบุหรี่, ภาวะขาดวิตามินเอ
เป็นต้น

มะเร็งกระเพาะอาหาร มีอาการท้องอืด
แน่นท้องอยู่เรื่อย เบื่ออาหาร ต่อมาอาจมีอาเจียน
คลำก้อนได้ที่ใต้

ชายโครงซ้าย น้ำหนักลด ซีด อาเจียนเป็นเลือด
ถ่ายดำ

มีสาเหตุสัมพันธ์กับการเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

จากเชื้อเฮลิโคแบคทีเรีย (H. pylori) แบบเรื้อรัง,
การกินอาหารที่มีสารไนเตรตหรือไนโตรซามีน,
อาหารเค็มหรือ

อาหารหมักเกลือ, อาหารประเภทรหมควัน,

กรรมพันธุ์, การมีประวัติการผ่าตัดกระเพาะอาหาร เป็นต้น

มะเร็งตับอ่อน เริ่มแรกอาจมีอาการท้องอืดเพื่อ
อาหารไม่ย่อย ต่อมามีอาการปวดท้อง
และปวดหลังดีขึ้น

ถ่ายอุจจาระสีซีดขาว เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ สารไนโตรซามีน

สารไฮโดรคาร์บอน การกินอาหารพวกไขมันแล
ะโปรตีนสูง และอาจมีสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์

มะเร็งลำไส้เล็ก มักมีอาการปวดท้อง

ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด หรือถ่ายดำ น้ำหนักลด
เป็นไข้ หรือ

ภาวะลำไส้อุดตัน (ปวดท้องรุนแรง อาเจียน)
บางรายอาจมีอาการดีซ่าน ถ่ายอุจจาระสีซีด
ขาว

อาจคลำได้ก้อนในช่องท้อง อาจมีสาเหตุร่วม

พัันธ์กับการเป็นลำไส้เล็กอักเสบเรื้อรัง

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มีอาการท้องผูกสลับกับท้องเดินแบบเรื้อรัง
หรือถ่ายเป็นเลือด หรือมูกปนเลือดเรื้อรัง

ปวดท้อง ปวดหลัง ซีด น้ำหนักลด
มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ เช่น
ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง,

การกินอาหารที่มีกากใยน้อยแต่กินพวกไ
ขมันมาก,
ประวัติการเป็นมะเร็งในญาติพี่น้อง
เป็นต้น

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

จะมีต่อมน้ำเหลืองโตเป็นก้อนที่บริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ อาจมีไข้เรื้อรัง

มีสาเหตุสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส เอชทีแอลวี-1, เชื้ออีบีวี, เอ็ดส์, การได้รับยาเคมีบำบัด หรือรังสี

บำบัดมาก่อน เป็นต้น

มะเร็งเต้านม คลำได้ก่อนที่เต้านม

ห้วนมบวม (เดิมเป็นปกติ

เพิ่งมาบวมตอนหลัง)

หรือมีน้ำเหลืองหรือ

เลือดออกทางห้วนมต่อมาจะมีต่อมน
้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันโต
ผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนีั เช่น

ผู้หญิงที่มีมารดาเป็นมะเร็งเต้านมก่อ
นวัยหมดประจำเดือน
หรือมีญาติพี่น้องเป็นโรคนีัหลังวัยปร
ะจำเดือน,

ผู้หญิงเกิน 50 ปี ที่ยังไม่มีบุตร,
ผู้หญิงที่มีบุตรคนแรกเมื่ออายุเกิน
30 ปี, ผู้หญิงที่มีประวัติเป็น

โรคเต้านมเรื้อรัง, คนอ้วน,
ผู้ที่สัมผัสถูกรังสี หรือดื่มเหล้า

มะเร็งปากมดลูก มีเลือดออกเวลาร่วมเพศ

มีเลือดออกกะปริดกะปรอยทางช่องคลอด หรือมีตกขาว

เรื้อรังมีสาเหตุสัมพันธ์กับการติดเชื้อ
อเอชพีวี (HPV/Human
papilloma virus)

ของปากมดลูกซึ่งเป็น

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับป
จจัยเสริมอื่นๆ เช่น
การกินยาเม็ดคุมกำเนิด
การสูบบุหรี่ เป็นต้น

โรคนี้อพบมากในผู้หญิงที่เริ่มมีเพศ
สัมพันธ์เมื่ออายุน้อย มีสามีหลายคน
หรือมีสามีสำสอนทางเพศ

และในหญิงบริการ

มะเร็งอัมฤต

พบมึ่ก่อนแข็งที่อัมฤต

และโตขึ้นเรื่อย ๆ

บางครั้งอาจมีอาการปวดร่วมด้วย

สาเหตุ

ยังไม่ทราบพบว่า

ผู้มีอันตะไม่เลือนลงอันตะ
ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
อาจค้างอยู่ในช่องทาง

หรือขาหนีบ

มีโอกาสเป็นมะเร็งอันตะมากขึ้น

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด

ปัสสาวะขัดและบ่อย

มีสาเหตุสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่

การสัมผัสสฤกสารอะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน (aromatic

hydrocarbon)

ที่เป็นสารประกอบของสี่ที่ใช้

ทางอุตสาหกรรม,

การกินอาหารพวกเนื้อปิ้ง ย่าง

และไขมันมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก

มักไม่มีอาการแสดง

จนกระทั่งแพร่กระจายไปยังอวัยวะ

ข้างเคียง

ทำให้มีอาการขัดเบา

ปัสสาวะลำบากหรือ

ปัสสาวะไม่ออก

ปัสสาวะเป็นเลือด

ปวดหลังหรือปวดสะโพกน้ำห

หนักลด มักพบในคนอายุ

ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

มีสาเหตุสัมพันธ์กับฮอร์โมนแ

อนโดรเจน

และพบว่าผู้มีประวัติญาติฟี

นองเป็นโรคนี้

หรือเคยทำหมันชาย

มีโอกาasเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้

สูงขึ้น

มะเร็งกระดูก มีอาการข้อบวม
กระดูกบวม
บางครั้งพบหลังเกิดอุบัติเหตุ
ทำให้เข้าใจว่าเป็นกระดูกหักไ
ด

มะเร็งของลูกตาในเด็ก (Ret emoblastoma)

นัยน์ตาดำของเด็กมีสีขาววาว
วคล้ายตาแมว เด็กจะบอกว่า

ตาข้างนั้นมืด หรือมองอะไร

ไม่เห็น เมื่อเป็นมากขึ้น
ตาจะเริ่มปวดไปนอกมานอ
กเบตา

มะเร็งรังไข่หรือไต

มีอาการมึ่กอนในท้อง

ท้องมาน

ส่วนมะเร็งเม็ดเลือดขาว

มะเร็งตับ มะเร็งในสมอง

จะมีอาการแบบเดียวกับ น้องอกในสมอง มะเร็งต่อมไทรอยด์

อาการของมะเร็งตามอวัยวะต่างๆ

เขียนโดย ภาษาศยาม

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2008 เวลา 16:47 น. - แก้ไขล่าสุด วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2008 เวลา 17:03 น.
